

## Betegtájékoztató: Információ a felhasználó számára

### Gentamicin-Wagner 1 mg/g kenőcs

gentamicin

**Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer és milyen betegségek esetén alkalmazható a Gentamicin Wagner 1 mg/g kenőcs (továbbiakban Gentamicin-Wagner kenőcs)?
2. Tudnivalók a Gentamicin-Wagner kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Gentamicin-Wagner kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Gentamicin-Wagner kenőcsöt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### **1. Milyen típusú gyógyszer a Gentamicin-Wagner kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

A Gentamicin-Wagner kenőcs antibiotikum tartalmú kenőcs gentamicinre érzékeny baktériumok okozta bőrfertőzések kezelésére.

A következő bőrfertőzések kezelésére javallott:

Primer bőrfertőzések, másodlagos bőrfertőzések, felületes égés, rovarcsípés, a körömágy gyulladása, felülfertőzött gombás és vírusos bőrfertőzések, lábszárfekély, különböző eredetű sebfertőzések. Hatékonyan használható sebészi úton feltárt, megnyitott tályogok kezelésére.

#### **2. Tudnivalók a Gentamicin-Wagner kenőcs alkalmazása előtt**

##### **Ne alkalmazza a kenőcsöt**

- ha allergiás a hatóanyagra (a gentamicinre) vagy a gyógyszer (6.pontban felsorolt) egyéb összetevőjére
- ha terhes vagy a szoptat
- ha fájdalmas bőrirritációt vált ki. Ha ilyen tünetet észlel, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- ha korábban aminoglikozid típusú antibiotikum használata során bármilyen nem várt hatást, tünetet észlelt.

##### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A Gentamicin-Wagner kenőcs alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

**A kenőcs összetevői túlérzékenységi reakciót okozhatnak, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű!**

Csak külsőleg alkalmazható!

Látható javulás hiányában más kezelésre kell áttérni.

8 év alatti gyermekeknek a készítmény nem ajánlott!

**Forduljon orvosához, ha az előző pontok valamelyike érinti, vagy bármikor a múltban érintette Önt!**

#### **Egyéb gyógyszerek és a Gentamicin**

Bizonyított gyógyszerkölsönhatások nem ismertek.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

#### **Termékenység, terhesség és szoptatás**

Magzatkárosító hatást nem írtak le.

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

#### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre nem ismert.

#### **A Gentamicin-Wagner kenőcs cetil-szteril-alkoholt tartalmaz**

A készítmény segédanyagként cetil-szteril-alkoholt tartalmaz, amely helyi bőrreakciókat okozhat (pl. kontakt dermatitisz).

### **3. Hogyan kell alkalmazni a Gentamicin-Wagner kenőcsöt?**

- A napi kezelések számát és a kezelés idejét a sérülés típusa és súlyossága szabja meg.
- Általában az érintett bőrfelületet 3-4-szer kell naponta vékonyan bekenni.
- Csak helyi kezelésre alkalmazható!

**Ha nem tudja hogyan használja a gyógyszert, minden esetben kérdezze meg gyógyszerészét!**

#### **Forduljon azonnal orvoshoz**

- amennyiben egy hét használat után javulást nem tapasztal vagy a kezelt felületen szokatlan tünetet észlel.
- minden esetben, ha korábban ismeretlen tünetet észlel a készítmény alkalmazása során /lásd még 4.pont/

#### **Ha az előírtnál több Gentamicin-Wagner kenőcsöt alkalmazott**

Ha az előírtnál több Gentamicin-Wagner kenőcsöt alkalmazott forduljon kezelőorvosához.

#### **Ha elfelejtette alkalmazni a Gentamicin-Wagner kenőcsöt**

Ha elfelejti gyógyszerét alkalmazni, ahogy eszébe jut, folytassa az előírt módon.

### **4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

**A kenőcs összetevői túlérzékenységi reakciót is okozhatnak, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű!**

**Azonnal hagyja abba a kezelést és értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén, ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli.**

- Néhányan allergiások lehetnek a kenőcs valamely összetevőjére. A használatát követő tünetek a következők lehetnek: bőrkiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, láz, kidagadó bőr erek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelületek. E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás.

**E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák.**

**Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyikét észleli.**

- Előfordulhatnak csípő, égető érzések, enyhe gyulladáshoz vezető tünetek.
- Az alkalmazás helyén napfény hatására bőr irritáció léphet fel.

**Ezek az enyhe mellékhatások ritkák.**

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét, Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## 5. Hogyan kell a Gentamicin-Wagner kenőcsöt tárolni?

- Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
  - A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.
  - A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha színében, szagában változást észlel.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szüségtelemné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

**Mit tartalmaz a Gentamicin-Wagner kenőcs**

**Hatóanyag:** 1,0 mg gentamicin (1,21 mg gentamicin-szulfát formájában) 1,0 g kenőcsben.

**Egyéb összetevők:** szorbitán-laurát, cetil-sztearil-alkohol, izopropil-mirisztát, tisztított víz, folyékony paraffin, természetes fehér vazelin.

**Milyen a Gentamicin-Wagner kenőcs külleme és mit tartalmaz a csomagolás**

Fehér színű, lágy, egynemű, vazelin típusú emulziós kenőcs, külső használatra, helyi kezelésre.

Csomagolás:

Kb. 15 g töltettségű kenőcs fehér, PE, csavaros, lyukasztóval ellátott kupakkal és alumínium membránnal lezárt fehér, alumínium tubusban.

Egy tubus tartalma 15 g.

1 tubus dobozban.

**A forgalombahozatali engedély jogosultja**

WAGNER-PHARMA Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft.  
H-3242 Parádsasvár  
Kossuth L.u. 44.

**Gyártó**

WAGNER-PHARMA Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft.  
H-6413 Kunfehértó  
IV. körzet 5. sz.

OGYI T-9690/01 (15 g)

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:** 2014. május